

## Punktacja Glasgow-Blatchford

służy określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia konieczności interwencji endoskopowej u pacjenta z ostrym krwawieniem z przewodu pokarmowego

Punkty	
<b>Ciśnienie skurczowe krwi (mmHg)</b>	
100 – 109	1
90 – 99	2
< 90	3
<b>Mocznik (mmol/l (mg%))</b>	
6,5 – 7,9 (18,2 – 22,2)	2
8,0 – 9,9 (22,3 – 27,8)	3
10,0 – 24,9 (27,9 – 69,8)	4
≥ 25,0 (69,9)	6
<b>Hemoglobina (mężczyźni, g%)</b>	
12,0 – 12,9	1
10,0 – 11,9	3
< 10,0	6
<b>Hemoglobina (kobiety, g%)</b>	
10,0 – 11,9	1
< 10,0	6
<b>Inne wskaźniki ryzyka</b>	
Tętno ≥ 100	1
Smoliste stolce	1
Omdlenie	2
Choroba wątroby	2
Niewydolność serca	2

Niskie ryzyko konieczności wykonania zabiegu endoskopowego występuje u pacjentów mających 0 punktów, czyli spełniających jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

- stężenie mocznika w surowicy < 6,5 mmol/l (18,2 mg%)
- stężenie hemoglobiny >13 g% u mężczyzn i >12 g% u kobiet
- ciśnienie skurczowe krwi 110 mmHg lub wyższe
- Częstość tętna < 100/min